

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 2 au Bulletin n° 128 du mois de Mai.

17 Mai 1971

## VIGNE

### MILDIU

Les orages qui ont éclaté sur le vignoble au cours de ces derniers jours, ont apporté une pluviométrie variable d'un secteur à l'autre, mais généralement suffisante pour permettre les premières contaminations de Mildiou. Les premières taches devraient apparaître incessamment.

En conséquence, nous conseillons d'effectuer un premier traitement fongicide dans la période du 21 au 22 Mai.

Dans les vignobles où la pluviométrie fut importante avant le 15 Mai, ce traitement serait à envisager dès le 19 Mai.

Enfin, dans le vignoble du TOULOIS, il est possible de retarder l'application de quatre à cinq jours.

### TORDEUSES DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis)

Le premier vol est sur le point de se terminer. Des pontes sont déposées sur les grappes et les éclosions semblent imminentes. Aussi, nous recommandons aux viticulteurs de prévoir la lutte contre ces tordeuses lors de l'intervention contre le Mildiou (consulter la liste des pesticides en votre possession).

Nous rappelons que les captures en pièges alimentaires furent très élevées.

### OIDIUM

Il sera également prudent d'ajouter un Soufre mouillable à la bouillie.

Le temps actuel reste très favorable à l'évolution de l'Oïdium.

.../...

129

## ARBRES FRUITIERS

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

La poussée végétative étant actuellement forte, une importante surface foliaire se trouve sans protection.

Les ascospores pouvant être libérées sont encore relativement nombreuses. Elles sont donc susceptibles d'assurer des contaminations primaires graves en cette période orageuse.

Un nouveau traitement devra être exécuté dès réception de la présente note.

### OIDIUM DU POMMIER

Profiter du traitement Tavelure pour renouveler la protection contre cette maladie.

Couper les pousses oïdiées.

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - CARPOCAPSE DES PRUNES

Le vol des papillons a débuté en cages d'élevage. Attendre de nouvelles indications de la Station pour intervenir.

### MOUCHE DE LA CERISE

Des vols sont actuellement observés. Un traitement sera à envisager, surtout sur les variétés tardives, lorsque l'on observera le début de rougissement des premiers fruits.

Utiliser l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

## ARBUSTES A PETITS FRUITS

### DESSECHEMENT DES RAMEAUX DU FRAMBOISIER

Les projections d'ascospores devenant nombreuses, renouveler le traitement dès que possible. Se rappeler que le traitement doit assurer la protection des jeunes pousses.

## CULTURES MARAICHIERES

### CRIOCERE DE L'ASPERGE

Le Criocère de l'asperge commence son activité. N'intervenir qu'en cas de forte attaque, soit en pulvérisation avec Lindane à 20 g de M.A./hl, ou Parathions à 30 g de M.A./hl, soit en poudrage avec l'un de ces produits.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles :  
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux :  
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 1 au Bulletin n° 128 publié en date du 12 Mai 1971.